




مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

مثل: أيبوبروفين **Ibuprofen** وديكلوفيناك **Diclofenac**

هي أدوية تُستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى وصفية وغير وصفية.

الحالات التي تُستخدم لها:


تخفف التهاب
المفاصل
الروماتويدي.



تخفف حالات
الالتهاب واحتكاك
المفاصل.




تخفيف الألم
والاحمرار
والتورم.




الأدوية اللاوصفية من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تُستخدم لـ:




ألم الدورة الشهرية



ارتفاع حرارة الجسم



التواء المفاصل



التهاب الأوتار



ألم الأسنان

أعراض جانبية منها :



الإمساك



جفاف الفم



إسهال



غثيان



صداع



ألم وحموضة بالمعدة


أعراض الحساسية منها:



انتفاخ الوجه



صعوبة في التنفس



الطفح الجلدي



مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

مثل: أيبوبروفين **Ibuprofen** وديكلوفيناك **Diclofenac**

هي أدوية تُستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى وصفية وغير وصفية.

تزداد احتمالية أن تسبب هذه الأدوية نزيفاً في الجهاز الهضمي في الحالات التالية:

- عند الاستخدام يومياً أو بشكل منتظم.
- للأشخاص أكبر من ٦٥ سنة.
- مَنْ لديهم تاريخ مع قرحة المعدة.
- مَنْ يستخدمون أدوية تزيد خطر الإصابة بالقرحة مثل: (مضادات التخثر ومشتقات الكورتيزون).
- التدخين
- شرب الكحول
- مَنْ لديه مرض متقدم بالكبد.


استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عدا الإسبرين، يزيد خطورة النوبات أو السكتات القلبية لدى المصابين بأمراض الأوعية الدموية القلبية خصوصاً لَمَنْ:



تعرض لسكتة قلبية



خضع لجراحة قلبية



تعرض لنوبات قلبية مؤخراً

الأعراض الجانبية الخطيرة قد تحدث في الأسابيع الأولى، وتزداد الخطورة بزيادة مدة استخدامها.

ماذا يمكن للمريض أن يفعل لتقليل مخاطر استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية؟

- اخبر الطبيب أو الصيدلي بتاريخك الطبي الكامل، بما يشمل أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة، وهذا يساعدك أنت وطبيبك على موازنة المخاطر والمنافع.
- استخدم أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة، وعند الاستخدام لمدة 10 أيام فأكثر، يجب عليك مراجعة الطبيب.