

بطاقة تنبيه المريض

توفاسي ٥ ملجرام و ١٠ ملجرام أقراص مغلفة
(توفاسيتينيب سيترات)

احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء

بطاقة سلامة المريض لدواء توفاسي (توفاسيتينيب)

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة لسلامتك يجب أن تكون على دراية بها قبل البدء بتناول توفاسي في حالة صعوبة فهم هذه المعلومات، يرجى أن تطلب من طبيبك/الصيدلي أن يشرحها لك.
- احتفظ بهذه البطاقة معك وأظهرها للطبيب أو الصيدلي المتابع لحالتك.
- للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على نشرة توفاسي الموجودة بالعلبة.
- أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، والفيتامينات والمكملات العشبية.
- لا يُنصح باستخدام توفاسي مع الأدوية الحيوية المضادة للروماتيزم المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي أو مع بعض الأدوية الأخرى التي تثبط جهاز المناعة (على سبيل المثال، آزاثيوبرين، تاكروليموس، سيكلوسبورين أو ميكوفينولات). قد يؤدي تناول توفاسي مع هذه الأدوية إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.
- أثناء العلاج بتوفاسي:
- أخبر طبيبك على الفور إذا:
- الإصابة بضيق مفاجئ في التنفس أو صعوبة في التنفس، أو ألم في الصدر أو ألم في الجزء العلوي من الظهر، أو تورم في الساق أو الذراع، أو ألم في الساق، أو احمرار أو تغير في لون الساق أو الذراع أثناء تناول توفاسي، حيث قد تكون هذه علامات على وجود جلطة في الرئتين أو الأوردة.
- ظهرت عليك أعراض عدوى، مثل الحمى أو السعال المستمر أو فقدان الوزن أو التعب المفرط. قد يزيد توفاسي من خطر إصابتك بالعدوى، والتي قد تصبح خطيرة إذا لم يتم علاجها. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى إذا كان عمرك ٦٥ عامًا أو أكبر، أو تعاني من مرض السكري أو مرض الرئة المزمن أو تتناول الكورتيكوستيرويدات. قد يوقف الطبيب المعالج بإيقاف العلاج توفاسي.
- ظهور أعراض أمراض الرئة، مثل ضيق التنفس.
- ظهور أي تورم في الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ؛ الشعور بالتعب المستمر؛ الحمى؛ التعرق الليلي؛ السعال المستمر أو المتفاقم؛ صعوبة التنفس؛ بحة في الصوت أو صفير عند التنفس؛ أو فقدان الوزن غير المبرر.
- ظهور أي نمو جديد على الجلد أو أي تغييرات في الشامات أو البقع الموجودة.
- ظهور أي أعراض للهربس النطاقي، مثل الطفح الجلدي المؤلم أو البثور.
- تعاملت عن قرب مع شخص مصاب بالسل.
- ظهرت لديك علامات وأعراض في البطن مثل آلام المعدة، أو آلام البطن، أو وجود دم في البراز، أو أي تغيير في عادات التبرز مع الإصابة بالحمى.
- عانيت من ظهور اصفرار الجلد أو الغثيان أو القيء.
- كان من الضروري أن تتلقى أي لقاح، هناك أنواعًا معينة من اللقاحات لا يجب تلقيها أثناء تناول توفاسي.

اطلب عناية طبية فورية وتوقف عن تناول توفاسي حتى مناقشة الأمر مع طبيبك إذا:

شعرت بأعراض الحساسية مثل ضيق الصدر، أو الصفير، أو الدوخة الشديدة أو الدوار، أو تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق، أو الحكة أو الطفح الجلدي عند تناول توفاسي أو بعد تناوله بفترة وجيزة.

معلومات أخرى (برجاء استكمال البيانات):

اسم المريض:

اسم الطبيب:

هاتف الطبيب:

اسم المستشفى:

هاتف المستشفى:

تاريخ بدء العلاج بعقار توفاسي:

إذا توقفت عن تناول توفاسي احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة شهرين على الأقل بعد تناول الجرعة الأخيرة من توفاسي.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

للإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مشتبه بها يرجى التواصل مع:

المركز الوطني للتبليغ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

• مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

• البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

• الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa>



شركة أماروكس السعودية للصناعة

رزان المالكي - أخصائي التبليغ الدوائي

شارع الجامعة - الملز - الرياض كود ١٢٦٢٩، المملكة العربية السعودية.

الهاتف: +٩٦٦١١٢٦٦٨٨٥٠

جوال: +٩٦٦٥٣١٢١٥٢٣٥

البريد الإلكتروني: r.almalki@amaroxpharma.com

- أصبحت حامل أو لديك نية للحمل ،لا يجب استخدام **توفاسي** أثناء الحمل إلا إذا كان ذلك ضروريًا. ننصح النساء في سن الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء العلاج **بتوفاسي** ولمدة ٤ أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة.

- لا يجب تناول **توفاسي** أثناء فترة الرضاعة